

**معلومات للمريض**  
**إبيديوليكس® 100 مجم/ مللى لتر محلول فموي**  
**كانابيديول**

---

▼ يخضع هذا الدواء إلى مراقبة إضافية. حيث سيسمح ذلك بالتعرف السريع على معلومات الأمان الحديثة. يمكنك المساعدة عن طريق الإبلاغ عن أية آثار جانبية قد تُصاب بها. انظر نهاية قسم "ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها دواء إبيديوليكس؟" لمعرفة كيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية.

## معلومات للمرضى

يُرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول أو استخدام هذا الدواء. تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي، فلا تُعطه لآخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يُعانون من نفس علامات المرض التي تعاني منها.

### في هذه النشرة:

1. ما هو دواء إبيديوليكس؟ وفيه يُستخدم؟
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول دواء إبيديوليكس؟
3. كيفية استخدام دواء إبيديوليكس
4. الآثار الجانبية المُحتملة
5. كيفية تخزين دواء إبيديوليكس
6. معلومات إضافية

### 1. ما هو دواء إبيديوليكس؟ وفيه يُستخدم؟

يُصرف بوصفة من الطبيب.

يحتوي دواء إبيديوليكس على الكانابيديول، وهو دواء يمكن استخدامه لعلاج الصرع، وهي حالة يصاب فيها الشخص بنوبات تشنج أو نوبات صرع.

يستخدم دواء إبيديوليكس بمصاحبة أدوية أخرى مضادة للصرع لعلاج نوبات التشنج التي تحدث مع الحالات النادرة، والتي تسمى متلازمة درايفيت (DS)، أو متلازمة لينوكس-جاستو (LGS)، أو التصلب الدرني المعقد (TSC).  
يمكن استخدامه لدى البالغين والمراهقين والأطفال بعمر سنتين على الأقل.

## 2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول دواء إبيديوليكس؟

لا تتناول دواء إبيديوليكس في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكانابينيدول أو تجاه أي مكون من المكونات الأخرى بهذا الدواء (المدرجة في قسم:6).
- إذا رأى طبيبك أن لديك نتائج غير طبيعية لبعض اختبارات الكبد بالدم.

### تحذيرات واحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول دواء إبيديوليكس أو أثناء العلاج في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني أو عانيت من مشاكل بالكبد، فقد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعة دواء إبيديوليكس أو قد يُقرر أن دواء إبيديوليكس غير مناسب لك.
- قد يجري طبيبك لك اختبارات دم لفحص وظائف الكبد لديك قبل أن تبدأ في تناول هذا الدواء وأثناء علاجك به، حيث إن دواء إبيديوليكس يمكن أن يسبب مشاكل في الكبد. إذا لم يكن الكبد لديك يعمل بشكل صحيح، فقد يلزم إيقاف العلاج.
- إذا كنت تعاني من أعراض عدوى الجهاز التنفسي مثل الحمى أو القشعريرة أو السعال أو الشعور بضيق التنفس أو الشعور بالنعاس أو الخمول.
- إذا لاحظت تغيرات غير معتادة في حالتك المزاجية أو سلوكك أو راودتك أفكار لإيذاء أو قتل نفسك. اتصل بطبيبك أو اذهب إلى المستشفى فوراً (انظر قسم "ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها دواء إبيديوليكس؟").
- يمكن أن يؤثر هذا الدواء على الاستجابة والقدرة على القيادة واستخدام الأدوات أو الآلات. تحدث مع طبيبك حول القيادة واستخدام الآلات، أو إذا كنت تمارس أنشطة مثل رياضة ركوب الدراجات أو غيرها من الرياضات فقد تشعر أنت أو المريض بالنعاس بعد تناول هذا الدواء. قد يُشعرك دواء إبيديوليكس بالنعاس. لا تمارس القيادة، أو تشغيل الآلات أو تُشارك في الأنشطة التي تتطلب منك الانتباه ورد الفعل السريع، مثل ركوب الدراجات، حتى تعرف كيف يؤثر دواء إبيديوليكس عليك.
- إذا توقفت عن تناول دواء إبيديوليكس فجأة.
- إذا تعرضت للإصابة بنوبات تشنج بشكل متكرر، أو إذا أصبت بنوبة تشنج شديدة أثناء تناول دواء إبيديوليكس. فتحدث إلى طبيبك أو اذهب إلى المستشفى فوراً.

### الأطفال والمراهقون

لا يُوصى باستخدام دواء إبيديوليكس في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

### الاستخدام المتزامن لدواء إبيديوليكس مع الأدوية الأخرى

يُرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أيّة أدوية أخرى. قد يؤدي تناول دواء إبيديوليكس مع بعض الأدوية الأخرى إلى حدوث آثار جانبية يمكن أن تؤثر على كيفية عمل الأدوية الأخرى أو تؤثر على كيفية عمل دواء إبيديوليكس. لا تبدأ أو توقف تناول أدوية أخرى بدون التحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أيّاً من الأدوية التالية؛ إذ قد يستلزم الأمر تعديل جرعتك:

- أدوية الصرع الأخرى، مثل كَرَبامازيبين، كلوبازام، لاموتريجين، لورازيبام، ميدازولام، فينيتوين، ستيروبينتول وفالبروات، والتي تستخدم لعلاج النوبات التشنجية.
- أدوية أخرى تستخدم لعلاج التصلب الدرني المعقد، بما في ذلك إيفيروليموس أو تاكروليموس.
- الأدوية التي تُستخدَم لعلاج الارتجاع الحمضي (حُرْقَةُ الْفُؤَاد أو ارتجاع الحمض) مثل أوميبرازول.
- ميتوتان (يستخدم لعلاج الأورام في الغدة الكظرية).

- مورفين أو ديفلونيزال (دواءان يستخدمان لعلاج الألم).
- إيفافيرينز (يُستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز).
- ثيوفيلين (يُستخدم لعلاج الربو).
- كافيين (دواء للأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة في التنفس) .
- بروبوفول (مخدر يستخدم للأشخاص الذين يخضعون لعملية جراحية) .
- سيمفاستاتين، فينوفايبرات، جيمفيبروزيل (تُستخدم لخفض الكوليسترول/الدهون) .
- إنز الوتاميد (يُستخدم لعلاج سرطان البروستاتا) .
- بوبزوبون (دواء يُستخدم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين أو لعلاج السمّة).
- نبتة سانت جونز (هايبيريكوم برفوراتام) (دواء عشبي يُستخدم لعلاج الاكتئاب) .
- أدوية لعلاج العدوى البكتيرية – مثل ريفامبيسين، وكلاريثروميسين وإريثروميسين.

الاستخدام المتزامن لدواء إبيديوليكس مع الطعام

تناول دائماً دواء إبيديوليكس وفقاً لتعليمات طبيبك وبشكل مستمر مع الطعام أو بدونه بما في ذلك الوجبات الغنية بالدهون (مثل نظام غذائي مُؤدّ للكيتون) (انظر أيضاً قسم "كيفية استخدام دواء إبيديوليكس"). إذا تناولت دواء إبيديوليكس مع الطعام، فيجب عليك دائماً تناول نوع مماثل من الوجبات (على سبيل المثال، محتوى مماثل من الدهون) قدر الإمكان.

يحتوي دواء إبيديوليكس على زيت السمسم والكحول (الإيثانول) ومكونات بنكهة الفراولة (مع كحول بنزيلي).  
يحتوي دواء إبيديوليكس على زيت السمسم المكرر والذي قد يسبب تفاعلات تحسسية شديدة في حالات نادرة.

يحتوي هذا الدواء على 7.9% حجمًا من الإيثانول (الكحول)، أي ما يصل إلى 691 مجم إيثانول لكل جرعة واحدة قصوى من دواء إبيديوليكس ( 12.5مجم/كجم لشخص بالغ يبلغ وزنه 70 كجم).

إن الكمية القليلة من الكحول في هذا الدواء لا تُحدث أي تأثير ملحوظ.

يحتوي هذا الدواء على 0.0003 مجم/مللي لتر من الكحول البنزيلي، أي ما يُعادل 0.0026 مجم لكل جرعة واحدة قصوى من دواء إبيديوليكس (12.5مجم/كجم لشخص بالغ يبلغ وزنه 70 كجم).

قد يسبب الكحول البنزيلي تفاعلات حساسية.

لا تستخدم هذا الدواء لمدة تزيد عن أسبوع واحد للأطفال الصغار (البالغين من العمر أقل من 3 سنوات) إلا بناءً على مشورة طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

إذا كنتِ حاملاً أو مُرضعاً، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي الخاص بك؛ لأن كميات كبيرة من الكحول البنزيلي قد تتراكم في جسمك وتسبب آثاراً جانبية (ما يسمى "الحمّاض الاستقلابي").

إذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكلى، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك؛ حيث يمكن أن تتراكم كميات كبيرة من الكحول البنزيلي في جسمك وتسبب آثاراً جانبية (ما يسمى "الحمّاض الاستقلابي").

أخبر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من أمراض أخرى

- إذا كان لديك أية حساسية أو
- تتناول أو تستخدم خارجياً أية أدوية أخرى (بما في ذلك الأدوية التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية).

### هل من الممكن استخدام دواء إبيديوليكس أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية؟

إذا كنتِ حاملاً، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لذلك، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول هذا الدواء. يجب ألا تتناولي دواء إبيديوليكس أثناء الحمل ما لم يقرر طبيبك أن الفوائد تفوق المخاطر المحتملة. يجب عليك عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية أثناء تناول دواء إبيديوليكس؛ إذ من المرجح أن يمر دواء إبيديوليكس إلى لبن الأم.

### 3 . كيفية استخدام دواء إبيديوليكس

تناول دائماً هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط. يُرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا من كيفية التناول.

دواء إبيديوليكس عبارة عن محلول فموي (سائل مُعد للبلع). سيخبرك طبيبك أو الصيدلي الخاص بك بالجرعة اليومية (عدد المرات لترات) من دواء إبيديوليكس التي يجب تناولها، وعدد مرات تناوله يوميًا، ونوع الحقنة (سرنجة) التي يجب أن تستخدمها لتناول جرعتك (1 مللي لتر أو 5 مللي لترات).

سيقوم طبيبك بحساب الجرعة وفقًا لوزن جسمك. يمكنك البدء بجرعة منخفضة، وسيقوم طبيبك بزيادتها تدريجيًا بمرور الوقت. تواصل مع طبيبك إذا لم تكن متأكدًا من جرعتك أو إذا كنت تعتقد أن جرعتك قد تحتاج إلى تغيير.

تناول دواء إبيديوليكس مع الطعام قد يزيد من كمية الدواء التي يمتصها جسمك. يجب عليك أن تحاول، قدر الإمكان، تناول دواء إبيديوليكس بشكل منتظم إما مع الطعام أو بدونه ووفقًا لروتينك اليومي، حتى تحصل على نفس التأثير في كل مرة. إذا كنت تتناول دواء إبيديوليكس مع الطعام، فيُنصح دائمًا بتناول وجبة مماثلة (مثلًا، ذات محتوى دهني مماثل) قدر الإمكان.

عند الضرورة، يمكن تناول دواء إبيديوليكس عبر أنبوب أنفي معدي أو أنبوب فغر المعدة. سيعطيك طبيبك تعليمات مفصلة حول كيفية القيام بذلك. يُرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا من كيفية القيام بذلك.

أخبر طبيبك إذا كانت لديك مشاكل بالكبد؛ فقد يحتاج الطبيب إلى تعديل الجرعة.

لا تخفض الجرعة أو تتوقف عن تناول هذا الدواء ما لم يخبرك الطبيب بذلك.

إذا تناولت أنت أو تناول مريضك جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها لك/لمريضك من دواء إبيديوليكس

إذا تناولت أنت أو تناول مريضك جرعة أكبر مما يجب من دواء إبيديوليكس، فأخبر الطبيب أو الصيدلي على الفور، أو اتصل بقسم الطوارئ في أقرب مستشفى لديك وخذ الدواء معك.

تشمل علامات تناول جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها من دواء إبيديوليكس الإسهال والنعاس.

إذا أغفلت أنت أو أغفل مريضك تناول دواء إبيديوليكس

إذا أغفلت أنت أو أغفل مريضك تناول جرعة، فلا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغفلتها. تناول الجرعة التالية في الموعد المعتاد. إذا أغفلت أنت أو مريضك تناول العديد من الجرعات، فيرجى التحدث إلى طبيبك حول الجرعة الصحيحة التي يجب تناولها.

إذا توقفت أنت أو مريضك عن تناول دواء إبيديوليكس

لا تخفض الجرعة أو تتوقف عن تناول دواء إبيديوليكس دون التحدث إلى طبيبك أولاً. سيشرح لك الطبيب كيفية التوقف التدريجي عن تناول دواء إبيديوليكس.

تعليمات استخدام دواء إبيديوليكس عن طريق الفم

انظر في نهاية هذه النشرة.

لا تغير الجرعة الموصوفة من تلقاء نفسك. إذا شعرت أن تأثير الدواء أقل من اللازم أو أقوى من اللازم، فاتصل بطبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

#### 4. الآثار الجانبية المحتملة

مثلته مثل كافة الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

قد تكون الآثار الجانبية التالية خطيرة للغاية:

- لوحظ ارتفاع إنزيمات الكبد (ارتفاع مستويات الناقلات الأمينية) في اختبارات الدم، والتي يمكن أن تكون علامة على إصابة بالكبد، والتي تم الإبلاغ عنها لدى المرضى الذين يتلقون دواء إبيديوليكس.
- من الممكن أن يفكر الأشخاص الذين يتناولون هذا الدواء بإيذاء أو قتل أنفسهم. إذا راودك أيُّ من هذه الأفكار في أي وقت، فاتصل بطبيبك فوراً.

قد تتعرض أيضًا للآثار الجانبية التالية مع هذا الدواء. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أيٍّ من الحالات التالية:

الآثار الجانبية الشائعة جدًا (قد تؤثر على أكثر من شخص واحد من بين كل 10 أشخاص)

- الشعور بالغثاس أو الخمول
- إسهال
- انخفاض الشهية
- حمى
- قيء
- شعور بالتعب

الآثار الجانبية الشائعة (قد تُؤثر على أكثر من شخص واحد من بين كل 100 شخص)

- اختبارات دم تظهر ارتفاع مستويات بعض إنزيمات الكبد.
- نوبات تشنجية
- الشعور بسوء المزاج (العصبية، العدوانية)
- طفح جلدي
- نقص الطاقة
- سعال
- الالتهاب الرئوي
- فقدان الوزن
- تَوَعُّك
- عدوى الجهاز البولي

إذا لاحظت آثارًا جانبية، خاصةً أي آثار جانبية غير موضحة في هذه النشرة، يجب عليك إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك بها.

## 5. كيفية تخزين دواء إبيديوليكس

يُحفظ بعيدًا عن مُتناوَل الأطفال.

لا تُستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المُدَوَّن على العبوة بعد كلمة ("EXP"). يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر. يُخزَّن في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية. لا تعرضه للتجميد.

فترة الاستخدام بعد الفتح لأول مرة

إذا كان لديك أي محلول متبقٍ في الزجاجة لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا بعد فتحها لأول مرة، فيجب ألا تُستخدم هذا الدواء.

لا تتخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الصَّرَف أو مع المخلفات المنزلية. استشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك عن كيفية التَّخلص من الأدوية التي لم تعد تُستخدمها. سيُساعد ذلك في حماية البيئة

## 6. معلومات إضافية

يمكن لطبيبك أو الصيدلي الخاص بك إمدادك بمزيد من المعلومات. هؤلاء الأفراد لديهم معلومات شاملة لأخصائيي الرعاية الصحية.

ما هي محتويات دواء إبيديوليكس؟

دواء إبيديوليكس عبارة عن محلول فموي صافٍ، عديم اللون يميل إلى اللون الأصفر. يتوفر في زجاجة بغطاء مقاوم لعبث الأطفال، مع حقنتين متطابقتين للجرعات الفموية سعة 5 مللي لترات أو 1 مللي لتر، وموائمين للزجاجة لاستخدام هذه الحقنات. تكون الحقنات سعة 5 مللي لترات مُدرَّجة بتدرجات 0.1 مللي لتر، والحقنات سعة 1 مللي لتر مُدرَّجة بتدرجات 0.05 مللي لتر.

المواد الفعالة

المادة الفعالة هي الكانابيديول. يحتوي كل مللي لتر من المحلول على 100 مجم كانابيديول.

السواغات (المواد غير الفعّالة)

المكونات الأخرى هي زيت السمسم المكرر والإيثانول اللاماني، سكرالوز ونكهة الفراولة (تحتوي على كحول بنزيلي).

ما هو شكل دواء إبيديوليكس؟ وما هي محتويات العبوة؟

دواء إبيديوليكس عبارة عن محلول صافٍ، عديم اللون يميل إلى اللون الأصفر. زجاجة واحدة سعة 100 مللي لتر  
حقنتان فمويتان سعة كل منهما 1 مللي لتر وموائم للزجاجة.  
حقنتان فمويتان سعة كل منهما 5 مللي لترات وموائم للزجاجة.

مالك حق التسويق

Jazz Pharmaceuticals Switzerland GmbH, Grafenauweg 8 6300 Zug, Switzerland.

جهة التصنيع

Jazz Pharmaceuticals Operations UK Limited, Unit 740 Kent Science Park, Sittingbourne ME9 8AG, United Kingdom.

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في أكتوبر 2022

للإبلاغ عن أي (ة) أثر / آثار جانبي(ة):

المملكة العربية السعودية:

المركز الوطني للتّيَقُّظ الدوائي:

مركز اتصال الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء: 19999

البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto:npc.drug@sfda.gov.sa)

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa>

الإمارات العربية المتحدة:

مؤسسة الإمارات للدواء

الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: [pv@ede.gov.ae](mailto:pv@ede.gov.ae)

رقم الهاتف: 80033784

**الكويت:**

وزارة الصحة الكويتية لمراقبة الأدوية والأغذية  
قسم إدارة مراقبة الأدوية الصيدلانية والعشبية وتسجيلها

هاتف: (4829287-24847475) +965

فاكس: +965 24847477

بريد إلكتروني: [ADR\\_reporting@moh.gov.kw](mailto:ADR_reporting@moh.gov.kw)

دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى:

الرجاء الاتصال بالسلطات المعنية المختصة.

قد لا يكون دواء إبيديوليكس® مسجلاً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي

**هذا مُنتَج دوائي**

- الدواء منتج يُؤثر على صحتك وتناوله على نحو مخالف للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتَّبِع بشكل صارم وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المُحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك. تُحَفَظ جميع الأدوية بعيداً عن مُتناول الأطفال


مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب

تعليمات استخدام دواء إبيديوليكس عن طريق الفم

تحتوي العبوة على العناصر التالية:




- زجاجة تحتوي على محلول دواء إبيديوليكس للتناول عن طريق الفم
  - كيس بلاستيكي يحتوي على حقنتين فمويتين سعة 1 مللي لتر وموائم زجاجة
  - كيس بلاستيكي يحتوي على حقنتين فمويتين سعة 5 مللي لترات وموائم زجاجة
- يتم توفير حقنة احتياطية لكل حجم في العبوة في حالة تلف الحقنة الأولى أو فقدانها.



1. افتح الكيس الذي يحتوي على حقنة الجرعات الصحيحة لقياس جرعتك.

- إذا كانت جرعتك 1 مللي لتر (100 مجم) أو أقل، فاستخدم الحقنة الأصغر حجمًا سعة 1 مللي لتر.
- إذا كانت جرعتك أكبر من 1 مللي لتر (100 مجم)، فاستخدم الحقنة الأكبر سعة 5 مللي لترات.
- إذا كانت جرعتك أكبر من 5 مللي لترات (500 مجم)، فستحتاج إلى استخدام الحقنة الأكبر سعة 5 مللي لترات أكثر من مرة واحدة. في هذه الحالة، احتفظ بسجل دقيق لعدد مرات ملء الحقنة (على سبيل المثال، عن طريق وضع علامة على كل جرعة قدرها 5 مللي لترات) حتى تتناول الجرعة الصحيحة.


باتباع توجيهات الطبيب أو الصيدلي، يجب إزالة الكيس الذي يحتوي على سرنجات الجرعات الأخرى والموائم من العبوة والتخلص منها ما لم يخبرك طبيبك أو الصيدلي الخاص بك بالاحتفاظ بسرنجاتي الجرعات حتى الوصول إلى الجرعة النهائية.




2. قم بازالة الغطاء المقاوم لعبث الأطفال الموجود على الزجاجه عن طريق الضغط عليه لأسفل مع تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.



3. ادفع موائم الزجاجه بإحكام داخل عنق الزجاجه، وتأكد من إدخاله بالكامل. قد ينفصل الموائم ويتسبب في حدوث اختناق إذا لم يدخل بالكامل.




4. قم بإدخال طرف الحقنة الفموية الصحيحة بالكامل في موائم الزجاجاة، ومع وجود الحقنة الفموية في مكانها، اقلب الزجاجاة رأساً على عقب.




5. اسحب مكبس الحقنة ببطء، بحيث يتم سحب الحجم (عدد المللي لترات) من المحلول المطلوب إلى الحقنة. قم بمحاذاة طرف المكبس مع علامة الحجم المطلوبة (كما هو موضح في الجهة المقابلة).

في حال وجود فقاعة هواء في الحقنة، ادفع السائل إلى الزجاجاة مع إبقاء الزجاجاة مقلوبة، وكرر الخطوة 5 حتى تزول الفقاعة.



6. اقلب الزجاجاة على الجانب الأيمن لأعلى، ثم قم بإخراج الحقنة الفموية بعناية من الموائم.




7. ضع طرف الحقنة الفموية داخل الخد، واضغط برفق على المكبس لإخراج الدواء. لا تضغط المكبس بقوة أو توجه الدواء إلى مؤخرة الفم أو الحلق.


إذا تجاوزت الجرعة 5 مللي لترات، كرر الخطوات من 4 إلى 7 لإعطاء الجرعة المتبقية باستخدام الحقنة الفموية سعة 5 مللي لترات.



**8.** أعد تثبيت غطاء الزجاجاة المقاوم لعبث الأطفال بإحكام، بتدويره باتجاه عقارب الساعة - لا داعي لإزالة موانئ الزجاجاة؛ لأن الغطاء سيثبت فوقه.



**9.** املاً كوبًا بالماء الدافئ والصابون، ونظّف السرنجة الفموية بسحب الماء وإخراجه باستخدام المكبس.



**10.** انزع المكبس من أسطوانة الحقنة، ثم اشطف كلا الجزأين بماء الصنبور. لا تضع الحقنة الفموية في غسالة الأطباق.

رجّ أي ماء من كلا الجزأين واتركهما يجفّان في الهواء حتى الاستخدام التالي. تأكد من جفاف الحقنة الفموية تمامًا قبل الاستخدام التالي، وإلا فقد يبدو المحلول غائمًا إذا دخل الماء إلى الزجاجاة.

إذا أصبح المحلول في الزجاجاة غائمًا، فهذا لا يغير مدى فعاليته. استمر في استخدام الدواء كالمعتاد.