

## SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

### 1. NÁZOV LIEKU

Sativex orálny roztokový sprej  
orálny roztokový sprej

### 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml obsahuje:

38-44 mg a 35-42 mg dvoch extraktov z *Cannabis sativa* L., folium cum flore (list a kvet konope), čo zodpovedá 27 mg delta-9-tetrahydrokanabinolu a 25 mg kanabidiolu.  
Extrakčné rozpúšťadlo: Kvapalný oxid uhličitý.

Každých 100 mikrolitrov spreja obsahuje:

2,7 mg delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) a 2,5 mg kanabidiolu (CBD).

Pomocné látky so známym účinkom:

Každých 100 mikrolitrov spreja obsahuje až 40 mg alkoholu (etanolu).

Každých 100 mikrolitrov spreja obsahuje 52 mg propylénglykolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

### 3. LIEKOVÁ FORMA

orálny roztokový sprej

Žltohnedý roztok v spreji.

### 4. KLINICKÉ ÚDAJE

#### 4.1 Terapeutické indikácie

Sativex je indikovaný ako liečba na zlepšenie symptómov u dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou spasticitou, spôsobenou sklerózou multiplex (SM), ktorí adekvátnie nereagovali na inú antispastickú liečbu a u ktorých sa počas úvodného skúšania terapie preukázalo klinicky signifikantné zlepšenie symptómov súvisiacich so spasticitou.

#### 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Sativex je určený len na orálne použitie.

Sativex je určený na použitie ako prídavná liečba súbežnej antispastickej liečby pacienta.

Liečbu musí začať a dohliadať na ňu lekár s odbornými znalosťami v oblasti liečby tejto skupiny pacientov.

**Dospelí:**

Nádobu so sprejom je potrebné pred použitím pretrepať a sprej nasmerovať na rôzne miesta slizničného povrchu úst tak, aby sa pri každom použití produktu zmenilo miesto aplikácie.

Pacienti majú byť poučení, že môže trvať až 2 týždne, kým sa zistí optimálna dávka a že počas tohto obdobia sa môžu objaviť nežiaduce účinky, najčastejšie závraty. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne mierne a po niekoľkých dňoch ustúpia. Lekári však majú na základe ich závažnosti a intenzity zvážiť zachovanie aktuálnej dávky, zníženie dávky alebo aspoň dočasné prerušenie liečby.

Aby sa minimalizovala variabilita biologickej dostupnosti u jednotlivého pacienta, podávanie Sativexu sa má čo možno najviac štandardizovať vzhladom na príjem potravy (pozri časť 4.5). Okrem toho si začatie alebo ukončenie užívania niektorých súbežne užívaných liekov môže vyžadovať novú titráciu dávky (pozri časť 4.5).

#### Titračná fáza:

Na dosiahnutie optimálnej dávky je potrebná titračná fáza. Počet a načasovanie vstrekov sa bude medzi jednotlivými pacientmi lísiť.

Počet vstrekov sa má každý deň zvyšovať podľa schémy uvedenej nižšie v tabuľke.

Popoludňajšia/večerná dávka sa má užívať kedykoľvek v čase medzi 16:00 hod. a uložením sa na nočný spánok. Keď sa zavedie ranná dávka, má sa užívať kedykoľvek medzi zobudením a poludním. Pacient môže ďalej postupne zvyšovať dávku o 1 vstrek denne až po maximum 12 vstrekov za deň dovtedy, kým nedosiahne optimálnu úľavu od symptómov. Medzi jednotlivými vstrekmi má byť aspoň 15-minútová prestávka.

Deň	Počet vstrekov ráno	Počet vstrekov večer	(Celkový počet vstrekov za deň)
1	<b>0</b>	<b>1</b>	1
2	<b>0</b>	<b>1</b>	1
3	<b>0</b>	<b>2</b>	2
4	<b>0</b>	<b>2</b>	2
5	<b>1</b>	<b>2</b>	3
6	<b>1</b>	<b>3</b>	4
7	<b>1</b>	<b>4</b>	5
8	<b>2</b>	<b>4</b>	6
9	<b>2</b>	<b>5</b>	7
10	<b>3</b>	<b>5</b>	8
11	<b>3</b>	<b>6</b>	9
12	<b>4</b>	<b>6</b>	10
13	<b>4</b>	<b>7</b>	11
14	<b>5</b>	<b>7</b>	12

#### Udržiavacia fáza:

Po titračnej fáze sa pacientom odporúča zachovávať dosiahnutú optimálnu dávku. V klinických skúšaniach bola stredná hodnota dávky u pacientov so sklerózou multiplex osiem vstrekov za deň. Po dosiahnutí optimálnej dávky si pacienti môžu rozložiť jednotlivé vstreky počas dňa podľa individuálnej odozvy a tolerancie. Ak dojde k akejkoľvek zmene závažnosti stavu pacienta, zmene súbežnej liečby alebo ak sa vyvinú ľažké nepriaznivé reakcie, môže byť vhodná opäťovná titrácia smerom nahor alebo nadol. Dávky vyššie ako 12 vstrekov za deň sa neodporúčajú.

#### Lekárska prehliadka:

Pred začiatkom terapie sa má dôkladne zhodnotiť závažnosť symptomov súvisiacich so spasticitou a odozva na štandardnú antispastickú liečbu. Sativex je indikovaný len u tých pacientov so stredne ľažkou až ľažkou spasticitou, ktorí neadekvátnie reagovali na inú antispastickú liečbu. Odozva pacienta

na Sativex sa má po štyroch týždňoch liečby prehodnotiť. Ak sa počas tohto úvodného skúšania terapie nespozoruje klinicky signifikantné zlepšenie symptómov súvisiacich so spasticitou, liečbu treba ukončiť. V klinických skúšaniach to bolo definované ako aspoň 20 % zlepšenie symptómov súvisiacich so spasticitou na pacientmi zaznamenanéj číselnej hodnotiacej stupnici od 0-10 (pozri časť 5.1). Význam dlhodobej terapie sa má pravidelne prehodnocovať.

### **Pediatrická populácia**

Sativex sa neodporúča používať u detí alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Randomizovaná placebo kontrolovaná štúdia bola vykonaná u detí a adolescentov s mozgovou obrnnou alebo traumatickým poškodením centrálnej nervovej sústavy a jej výsledky týkajúce sa účinnosti boli negatívne. Údaje sú popísané v časti 5.1).

### **Starší pacienti**

Neuskutočnili sa žiadne špecifické štúdie u starších pacientov, aj keď klinických skúšaní sa zúčastnili aj pacienti do 90 rokov. Keďže starší pacienti môžu byť náchylnejší na vznik niektorých nežiaducích reakcií na CNS, je potrebné dávať pozor na osobnú bezpečnosť, napríklad pri príprave teplých jedál a nápojov.

### **Pacienti s významným zhoršením hepatálnych a renálnych funkcií**

Nie sú k dispozícii údaje s viacnásobným dávkovaním u osôb s poruchou funkcie pečene. Sativex sa môže podávať pacientom s miernym poškodením pečene bez akejkoľvek úpravy dávkowania. Podávanie pacientom so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa neodporúča kvôli nedostatku informácií o možnosti akumulácie THC a CBD pri chronickom dávkovaní (pozri časť 4.4 a 5.2).

Neuskutočnili sa žiadne štúdie u pacientov so zhoršenými renálnymi funkciami. V týchto subpopuláciách pacientov však môžu byť účinky Sativexu zvýraznené alebo predĺžené. V týchto populáciách pacientov sa odporúča časté klinické hodnotenie stavu lekárom (pozri časť 4.4).

### **4.3 Kontraindikácie**

Sativex je kontraindikovaný u pacientov:

- s precitlivenosťou na kanabinoidy alebo ktorukoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
- s anamnézou, podozrením na anamnézu alebo rodinnou anamnézou schizofrénie alebo iného psychotického ochorenia; anamnéza ľažkej poruchy osobnosti alebo inej významnej psychiatrickej poruchy s výnimkou depresie súvisiacej so základným ochorením.
- u dojčiacich žien (vzhľadom na predpokladané významné hladiny kanabinoidov v materskom mlieku a potenciálne nežiaduce účinky na vývoj dojčiat).

### **4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní**

Často sú hlásené mierne alebo stredne ľažké závraty. Najčastejšie sa objavujú počas niekoľkých prvých týždňov liečby.

Po podaní úvodnej dávky sa pozorovali zmeny pulzovej frekvencie a krvného tlaku, preto je počas titrácie úvodnej dávky nevyhnutné postupovať opatrne. Pri používaní Sativexu boli pozorované epizódy straty vedomia. Používanie Sativexu sa neodporúča u pacientov so závažným kardiovaskulárnym ochorením. Po podávaní Sativexu zdravým dobrovoľníkom v dávkach do 18 vstrekov dvakrát denne však nedošlo k žiadnym klinicky relevantným zmenám v trvaní QTc, PR alebo QRS intervalu, pulzovej frekvencie ani krvného tlaku.

Kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné postupovať opatrne pri liečbe pacientov s anamnézou epilepsie alebo opakujúcich sa záchvatov.

Počas liečby Sativexom boli hlásené psychiatrické symptómy ako úzkosť, ilúzie, zmeny nálady a paranoidné predstavy. Tieto symptómy sú pravdepodobne dôsledkom prechodných účinkov na CNS, zvyčajne bývajú mierne až stredne závažné a dobre tolerované. Dá sa očakávať, že po zredukovaní alebo prerušení liečby Sativexom ustúpia.

Hlásené boli aj prípady dezorientácie (alebo zmätenosti), halucinácií a klamlivých vnemov alebo prechodné psychotické reakcie, a v niektorých prípadoch nebolo možné vylúčiť príčinnú súvislost medzi podávaním Sativexu a suicídálnymi predstavami. Za ktorýchkoľvek z týchto okolností sa má Sativex okamžite prestať podávať a pacient sa má monitorovať dovtedy, kým symptóm úplne nevymizne.

Pacientom, u ktorých došlo k redukcii spasticity, a ktorých svalová sila nie je dostatočná na udržanie polohy alebo vytrvanie pri chôdzi môže hroziť riziko zvýšeného výskytu pádov. Navyše k zvýšenému riziku pádov, nepriaznivé účinky Sativexu na CNS, predovšetkým u starších pacientov by potenciálne mohli mať dopad na rozličné aspekty osobnej bezpečnosti, napríklad pri príprave teplých jedál a nápojov.

Aj keď existuje teoretické riziko aditívneho účinku zvyšujúceho riziko pádov s látkami spôsobujúcimi relaxáciu svalov ako je baklofén a benzodiazepíny, v klinických štúdiach so Sativexom tento účinok neboli pozorované. Pacientov je však treba na túto možnosť upozorniť.

### **Ženy vo fertilnom veku**

Sativex môže znižovať efektivitu hormonálnej antikoncepcie (pozri časť 4.5).  
Ženy vo fertilnom veku musia používať vysoko účinnú antikoncepciu počas užívania Sativexu.  
V súčasnosti nie je známe, či Sativex môže znižovať účinnosť hormonálnej antikoncepcie a preto ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu majú počas trvania liečby a tri mesiace po ukončení liečby používať dodatočnú metódu antikoncepcie (pozri časť 4.5 a 4.6).

Gravidita a dojčenie: pozri časť 4.6.

Pacienti s anamnézou zneužívania návykových látok môžu mať väčší sklon zneužívať aj Sativex (pozri časť 5.1).

Náhle ukončenie dlhodobej liečby Sativexom neviedlo k zhodnému modelu alebo časovému profilu abstinencných príznakov a pravdepodobné dôsledky budú obmedzené na výskyt prechodných porúch spánku, emócií alebo apetítu u niektorých pacientov. Pri dlhodobom používaní sa nepozorovalo žiadne zvýšenie denného dávkowania a stupne „intoxikácie“ nahlasované samotnými pacientmi sú nízke. Z týchto dôvodov je vznik závislosti na Sativexe nepravdepodobný.

Boli hlásené nežiaduce reakcie, ktoré by mohli súvisieť so spôsobom podávania lieku. Reakcie v mieste aplikácie lieku tvorilo najmä mierne až stredne silné štípanie v čase aplikácie. Medzi časté reakcie v mieste aplikácie lieku patrí bolesť v mieste aplikácie, bolesť a diskomfort v ústnej dutine, dysgeuzia, ulcerácie v ústach a glosodýnia. Pozorovali sa dva prípady možnej leukoplakie, žiadna z nich však nebola histologicky dokázaná; tretí prípad nesúvisel s podávaním lieku. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa pacientom, ktorí zaznamenajú diskomfort alebo ulceráciu v mieste aplikácie lieku odporúča, aby obmieňali miesto aplikácie lieku v ústach, a aby viac nevstrekovali liek na boľavú alebo zapálenú sliznicu. Pri dlhodobom podávaní lieku sa odporúča aj pravidelné kontrolovanie ústnej sliznice. Ak sa spozorujú lézie alebo pretrvávajúca bolestivosť, podávanie lieku treba prerušiť dovtedy, kým nedôjde k úplnému vymiznutiu ľažkostí.

Pre prípad cestovania do zahraničia majú byť pacienti poučení, že vyvážanie tohto lieku do niektorých krajín môže byť ilegálne. Treba im odporučiť, aby si pred cestovaním so Sativexom overili jeho právny status v príslušných krajinách.

#### Pomocné látky

Každých 100 mikrolitrov Sativexu obsahuje až 40 mg etanolu, čo zodpovedá 50 % objemu etanolu, čo je približne 480 mg na maximálnu dennú dávku (pre dospelú osobu s hmotnosťou 70 kg), čo zodpovedá približne 10 ml piva alebo 5 ml vína. Malé množstvo alkoholu v tomto lieku nemá žiadny pozorovateľný vplyv.

Tento liek obsahuje 52 mg propylénglykolu v každom 100 mikrolitrovom spreji.

#### 4.5 Liekové a iné interakcie

##### Možný účinok Sativexu ovplivniť iné liečivá/lieky

V prípade *in vitro* štúdií bolo pozorované, že Sativex je reverzibilný inhibítorm CYP3A4, 1A2, 2B6, 2C9 a 2C19 v koncentráciach, ktoré boli oveľa vyššie ako koncentrácie, ktoré sa pravdepodobne dosiahnu klinicky. Štúdie *in vitro* preukázali, že Sativex mal potenciál pre časovo závislú inhibíciu CYP3A4 v klinicky relevantných koncentráciach. Predpokladá sa rýchlosť inaktivácie enzymu CYP3A4. Súbežné podávanie Sativexu s inými substráti CYP3A4 môže mať za následok zvýšenie plazmatickej koncentrácie súbežne podávaného lieku. Je doporučené prehodnotiť dávkovací režim tohto lieku.

*In vitro* štúdie naznačujú, že plazmatická koncentrácia THC a CBD, vyplývajúca z klinických dávok Sativexu, by mohla byť dostatočná pre vyvolanie zvýšenej aktivity CYP1A2 a CYP3A4 na úrovni mRNA. Súbežné podávanie Sativexu s inými liekmi, ktoré sa metabolizujú prostredníctvom enzymov cytochrómu P-450, môže spôsobiť urýchlenie metabolizmu a zniženie aktivity iných liekov ako sú kumaríny, beta-blokátory a kortikosteroidy. Je doporučené preskúmanie dávkovacieho režimu liekov citlivých na CYP, pokiaľ sa užívajú spolu so Sativexom.

##### UGT enzymy

Počas *in vitro* štúdie bolo zistené, že Sativex inhibuje UGT enzymy UGT1A9 a UGT2B7 v koncentráciach, ktoré možno klinicky dosiahnuť. Je potrebné venovať zvláštnu pozornosť pri súbežnom predpisovaní Sativexu s inými liekmi, ktoré sú metabolizované výlučne obomi alebo jedným z týchto enzymov (napr. Propofol a určité antivirotyká). Pacienti s genetickou poruchou glukoronidácie (napr. Gilbertov syndróm) môžu vykazovať zvýšené koncentrácie bilirubínu v sére a musia sa liečiť s opatrnosťou pri súbežnom podávaní so Sativexom.

##### Sativex môže byť ovplyvnený inými liečivami/liekmi

Dve hlavné zložky Sativexu, delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD), sú metabolizované enzymatickým systémom cytochrómu P<sub>450</sub>.

##### Inhibícia enzymov cytochrómu P-450

Súbežná liečba inhibítorm CYP3A4 ketokonazolom spôsobila zvýšenie hodnôt C<sub>max</sub> a AUC THC (1,2- násobne, a 1,8-násobne, v uvedenom poradí), jeho primárneho metabolitu (3-násobne, a 3,6-násobne v uvedenom poradí) a CBD (2- násobne, a 2-násobne v uvedenom poradí). Z uvedeného vyplýva, že ak sa počas liečby Sativexom začne alebo ukončí súbežná medikamentózna liečba inhibítormi CYP3A4 (napr. itrakonazol, ritonavir, klaritromycín), môže byť potrebná titrácia novej dávky (pozri časť 4.2).

Súbežná liečba Sativexu (4 vstreky) s inhibítorm CYP2C9 flukonazolom (200 mg kapsula) viedla k zvýšeniu priemernej C<sub>max</sub> THC o 22% a priemernej AUC o 32%. Exponencia metabolitu 11-OH-THC sa tiež zvýšila približne o 2,1- násobne a 2,5-násobne v prípade C<sub>max</sub> a AUC, čo naznačuje, že flukonazol môže inhibovať jeho následný metabolizmus. C<sub>max</sub> CBD tiež vzrástla približne o 40% ale nedošlo k významnej zmene AUC. Nezaznamenala sa žiadna významná zmena exponencie 7-OH-CBD, hoci sa pozorovalo zvýšenie malého cirkulujúceho metabolitu CBD, 6-OH CBD (až 2,2-násobne na základe C<sub>max</sub> a AUC). Klinický význam tejto interakcie medzi liečivami nie je úplne pochopený, pri súbežnom podávaní Sativexu s účinnými inhibítormi CYP2C9 je však potrebné postupovať opatrnne, pretože môže dôjsť k zvýšeniu exponencie THC, CBD a ich metabolitov.

### Zvýšenie aktivity enzýmov cytochrómu P-450

Po liečbe induktorm CYP3A4 rifampicínom sa pozorovali zníženia hodnôt  $C_{max}$  a AUC THC (40 %, a 20 % zníženie v uvedenom poradí), jeho primárneho metabolitu (85 % a 87 % zníženie v uvedenom poradí) a CBD (50 % a 60 % zníženie v uvedenom poradí). Z uvedeného vyplýva, že je potrebné vyhnúť sa súbežnej liečbe silnými induktormi enzýmov (napr. rifampicín, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital, ľubovník bodkovany) vždy, keďže to možné. Pokial' je súbežná liečba nevyhnutná, odporúča sa opatrná titrácia dávky, a to najmä do dvoch týždňov po ukončení liečby induktormi enzýmov.

### Všeobecne

Opatrne je potrebné postupovať pri hypnotikách, sedatívach a liekoch s potenciálnym sedatívnym účinkom, pretože môže dôjsť k aditívnomu účinku na sedáciu a svalovorelaxačné účinky.

Aj keď sa u pacientov, ktorí užívajú antispastické látky so Sativexom nevyskytla vyššia miera nežiaducich príhod, v prípade, že sa Sativex podáva súbežne s týmito látkami je potrebné postupovať opatrne, pretože môže dôjsť k zníženiu svalového tonusu a sily, čo vedie k väčšiemu riziku pádov.

Sativex môže interagovať s alkoholom a ovplyvniť koordináciu, koncentráciu a schopnosť rýchlo reagovať. Vo všeobecnosti je v čase užívania Sativexu potrebné vyhýbať sa alkoholickým nápojom, najmä na začiatku liečby alebo pri zmene dávky. Pacienti majú byť poučení, že ak budú v čase užívania Sativexu piť alkohol, aditívne účinky na CNS môžu zhoršiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje a zvýšiť riziko pádov a iných nehôd.

### Hormonálna antikoncepcia

*In vitro* sa zistilo, že Sativex indukuje enzýmy metabolizujúce liek a prenášače. Sativex môže znížovať účinnosť systémovo pôsobiacej hormonálnej antikoncepcie a preto by ženy, ktoré užívajú perorálnu hormonálnu antikoncepciu, mali používať ďalšiu bariérovu metódu.

### **4.6 Fertilita, gravidita a laktácia**

Skúsenosti týkajúce sa účinkov Sativexu na reprodukciu u ľudí sú nedostatočné. Napriek tomu, že neboli zaznamenané žiadny účinok na plodnosť, nezávislý výskum na zvieratách zistil, že kanabinoidy postihujú spermatogenézu (pozri časť 5.3).

Z tohto dôvodu majú muži a ženy v reprodukčnom veku i počas trvania liečby a tri mesiace po ukončení liečby dodržiavať spoľahlivé antikoncepcné opatrenia.

Pacientkám užívajúcim hormonálne kontraceptíva by sa malo doporučiť používanie alternatívnych, nehormonálnych/spoľahlivých bariérových metód kontroly pôrodnosti počas liečby Sativexom.

### Gravidita

Sativex sa nemá užívať počas gravidity pokial' sa nezváži, že prínos liečby preváži potenciálne riziká pre plod a/alebo embryo.

### Dojčenie

Dostupné farmakodynamické / toxikologické údaje na zvieratách potvrdili vylučovanie Sativexu / metabolítov do mlieka (detaily pozri časť 5.3).

Riziko u dojčeného dieťaťa nemožno vylúčiť. Sativex je kontraindikovaný počas dojčenia (pozri časť 4.3).

### Fertilita

V štúdiách fertility na hlodavcoch sa nezistil žiadny účinok liečby Sativexom na samcov alebo samice. U mláďať matiek liečených Sativexom sa nezistil účinok na fertilitu.

#### 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viest' vozidlá a obsluhovať stroje

Sativex môže vyvolávať nežiaduce účinky, ako sú závraty a somnolencia, čo môže zhoršiť úsudok a výkon pri kvalifikovaných prácach. Ak sa u pacientov prejavujú akékoľvek významné účinky na CNS, ako sú závraty alebo somnolencia, nemajú viest' vozidlá, obsluhovať stroje ani sa zapájať do žiadnej nebezpečnej aktivity. Pacienti majú byť informovaní, že o Sativexe je známe, že spôsobil niekoľko prípadov straty vedomia.

Tento liek môže zhoršiť kognitívne funkcie a môže ovplyvniť schopnosť pacienta bezpečne viest' vozidlo. Pri predpisovaní tohto lieku treba pacientov upozorniť:

- liek pravdepodobne ovplyvní vašu schopnosť viest' vozidlo
- nevedzte vozidlo, kým neviete, ako vás liek ovplyvňuje
- skontrolujte, či vnútrostátne predpisy stanovujú požiadavky na vedenie vozidla pod vplyvom tohto lieku

#### 4.8 Nežiaduce účinky

Klinický program skúmajúci Sativex doposiaľ zahrnul 1500 pacientov so SM do placebom kontrolovaných a dlhodobých otvorených štúdií, v ktorých niektorí pacienti užívali do 48 vstrekov za deň.

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas prvých štyroch týždňov expozície boli závraty, ktoré sa objavujú hlavne počas úvodnej titračnej fázy a únavy. Tieto reakcie sú zvyčajne mierne až stredne silné a ustúpia do niekoľkých dní, a to aj v prípade, že liečba pokračuje (pozri časť 4.2). Keď sa použil odporúčaný rozpis na titrovanie dávky, výskyt závratov a únavy sa počas prvých štyroch týždňov značne znížil.

Frekvencia výskytu nežiaducích príhod s pravdepodobným vzťahom k užívaniu Sativexu zistená v placebom kontrolovaných skúšaniach lieku u pacientov so SM, zoradená podľa Triedy orgánových systémov (SOC) je uvedená nižšie (niektoré z týchto nežiaducích účinkov môžu byť súčasťou základného ochorenia).

MedDRA SOC	Veľmi časté ≥ 1/10	Časté ≥ 1/100 až < 1/10	Menej časté ≥ 1/1000 až < 1/100
Infekcie a nákazy			faryngítida
Poruchy metabolizmu a výživy		anorexia (vrátane zníženého apetítu), zvýšený apetít	
Psychické poruchy		depresia, dezorientácia, disociácia, euforická nálada,	halucinácie (nešpecifikované, sluchové, zrakové), bludy, paranoja, suicídialne myšlienky klamlivé vnemy*
Poruchy nervového systému	závraty	amnézia, poruchy rovnováhy, poruchy pozornosti, dysartria, dysgeuzia, letargia, zhoršenie pamäte, somnolencia	synkopa
Poruchy oka		rozmazané videnie	

Poruchy ucha a labyrintu		vertigo	
Poruchy srdca a srdcovej činnosti			palpitácie, tachykardia
Poruchy ciev			hypertenzia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína			podráždenie hrdla
Poruchy gastrointestinálneho traktu		zápcha, hnačka, sucho v ústach, glosodýnia, ulcerácie v ústach, nauzea, diskomfort v ústnej dutine, bolest' v ústnej dutine, vracanie	bolesti brucha (hornej časti), zmeny sfarbenia sliznice úst*, poruchy sliznice úst, odlupovanie sliznice úst*, stomatitída, zmeny sfarbenia zubov
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania	únavu	bolest' v mieste aplikácie, astenia, pocit abnormálnosti, pocit opitosti, nepokoj	podráždenie v mieste aplikácie
Úrazy, otvary a komplikácie liečebného postupu		pád	

\* hlásené v dlhodobých otvorených štúdiách:

Hlásený bol jediný prípad komorovej bigemínie, avšak k tejto udalosti došlo v kontexte akútnej alergickej reakcie na orechy.

Pozri aj časti 4.4, 4.5 a 4.7.

#### Hľásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hľásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

#### **4.9 Predávkovanie**

Nie sú žiadne skúsenosti s úmyselným predávkovaním pacientov Sativexom. V dôkladnej štúdii QT intervalu u 257 jednotlivcov užívajúcich Sativex sa však pri aplikácii 18 vstrekov v priebehu 20 minút dvakrát denne pozorovali prejavy a príznaky predávkovania/otravy. Pozostávali z reakcií typu akútnej intoxikácie za produkcie CB<sub>1</sub> agonistický typ reakcie vrátane závratov, halucinácií, preludov, paranoje, tachykardie alebo bradykardie s hypotensiou. U troch zo 41 jedincov užívajúcich dávku 18 vstrekov dvakrát denne sa predávkovanie prejavilo ako prechodná toxicická psychóza, ktorá ustúpila po prerušení liečby. Dvadsaťdva jedincov, ktorí dostávali tento podstatný viacnásobok odporúčanej dávky úspešne ukončilo 5-dňovú študijnú fázu.

V prípade predávkovania sa má podávať symptomatická a podporná liečba.

### **5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI**

#### **5.1 Farmakodynamické vlastnosti**

Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká, Iné analgetiká a antipyretiká  
ATC kód: N02BG10

Európska agentúra pre lieky udelila odsklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií so Sativexom pri spasticite v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

### Mechanizmus účinku

Kanabinoidné receptory CB<sub>1</sub> a CB<sub>2</sub> sa ako súčasť ľudského endokanabinoidného systému (EKS) nachádzajú prevažne na nervových zakončeniacach, kde zohrávajú úlohu v retrográdnej regulácii synaptickej funkcie. THC pôsobí na CB<sub>1</sub> aj CB<sub>2</sub> receptoroch ako čiastočný agonista, napodobňuje účinky endokanabinoidov, ktoré môžu modulovať účinky neurotransmitterov (napr. znižovať účinky excitačných neurotransmitterov, ako je glutamát).

Na zvieracích modeloch SM a spasticity sa preukázalo, že agonisty CB receptorov zmierňujú stuhnutosť končatín a zlepšujú ich motorickú funkciu. Týmto účinkom bránia antagonisty CB receptorov a na myšiach s vyraďenými CB<sub>1</sub> receptormi sa preukázala závažnejšia spasticita. Na myšacom modeli CREAE (chronická recidivujúca experimentálna autoimunitná encefalomyelítida) spôsobil Sativex od dávky závislé zníženie stuhnutia zadných končatín.

### Klinické skúsenosti

Sativex bol skúmaný v kontrolovaných klinických skúšaniach trvajúcich do 19 týždňov v dávkach do 48 vstrekov/deň u viac ako 1500 pacientov so SM. V kľúčových štúdiách hodnotiacich účinnosť a bezpečnosť Sativexu určeného na zmiernenie symptómov u pacientov s miernou až stredne závažnou spasticitou spôsobenou sklerózou multiplex (SM) bola primárnym kritériom účinnosti číselná hodnotiaca stupnica (ČHS) od 0 do 10 bodov, na ktorú pacienti vyznačovali priemerný stupeň svojich symptómov súvisiacich so spasticitou za posledných 24 hodín, pričom 0 znamená žiadna spasticita a 10 predstavuje najhoršiu možnú úroveň spasticity.

Počas 6 týždňov trvajúcej terapeutickej fázy prvého placebom kontrolovaného skúšania fázy 3 dosiahlo rozdiel v porovnaní s placebom štatistikú významnosť, ale otázna bola klinická relevancia 0,5 až 0,6 bodového rozdielu medzi terapiami na ČHS od 0 do 10 bodov. V analýze odozvy, ktorá využívala kritérium redukcie skóre na ČHS väčšej ako 30 % reagovalo na liečbu 40 % pacientov užívajúcich Sativex a 22 % pacientov užívajúcich placebo.

Druhá 14-týždňová štúdia fázy 3 nepreukázala signifikantný terapeutický účinok. Rozdiel skóre na ČHS oproti placebo bol 0,2 bodu.

Predpokladalo sa, že klinicky prospesný terapeutický účinok u niektorých pacientov môže byť v analýze priemerných zmien čiastočne zamaskovaný údajmi od pacientov, ktorí nereagovali na liečbu. V analýzach porovnávajúcich skóre na ČHS s celkovým dojmom pacienta zo zmeny (CDP) sa stanovilo, že 19 % odozva na ČHS predstavuje klinicky relevantné zlepšenie CDP a 28 % odozva na ČHS predstavuje „oveľa zlepšený“ CDP. V prieskumnej kombinovanej post hoc analýze dvoch vyššie uvedených štúdií slúžila 4-týždňová skúšobná fáza využívajúca 20 % prahovú odozvu na ČHS ako prediktor eventuálnej odozvy definovanej ako 30 % redukcia symptómov.

Tretie klinické skúšanie fázy 3 zahŕňalo formalizovanú 4-týždňovú terapeutickú fázu, ktorá predchádzala randomizáciu. Cieľom tohto skúšania bolo zhodnotiť prínos pokračujúcej liečby pre pacientov, ktorí dosiahli prvotnú odozvu na liečbu. Všetkých 572 pacientov so SM a refraktérnou spasticitou dostávalo 4 týždne zaslepeným spôsobom jedine Sativex. Po štyroch týždňoch aktívnej liečby dosiahlo 273 pacientov zníženie symptómov súvisiacich so spasticitou minimálne o 20 % na ČHS, z nich splnilo vstupné kritérium na randomizáciu 241 pacientov, s priemernou zmenou oproti začiatku liečby -3,0 bodu na 10-bodov ČHS. Títo pacienti boli potom randomizovaní do skupín, v rámci ktorých počas 12-týždňovej dvojito zaslepenej fázy buď pokračovali v liečbe alebo sa im liečba zmenila na placebo, aby celkovo absolvovali 16 týždňov liečby.

Počas dvojito zaslepenej fázy zostávali priemerné hodnoty skóre na ČHS u pacientov liečených Sativexom celkovo stabilné (priemerná zmena skóre na ČHS od randomizácie -0,19), kým priemerné hodnoty skóre na ČHS pacientov, ktorých liečba sa zmenila na placebo sa zvýšili smerom (priemerná

zmena skóre na ČHS bola +0,64 a medián zmeny bol +0,29). Rozdiel\* medzi terapeutickými skupinami bol 0,84 (95 % IS -1,29; -0,40).

\* Rozdiel upravený podľa centra, počiatočného skóre na ČHS a ambulantného stavu

Z tých pacientov, ktorí dosiahli v 4. týždni 20 % zníženie skóre na ČHS oproti skríningu, a ktorí pokračovali v skúšaní užívaním randomizovanej terapie, 74 % (Sativex) a 51 % (placebo) dosiahlo v 16. týždni 30 % redukciu symptómov.

Výsledky získané v sekundárnych koncových bodoch po 12-týždňovej randomizovanej fáze sú zobrazené nižšie. Väčšina sekundárnych koncových bodov vykazovala podobný charakter skóre na ČHS, pričom pacienti, ktorí pokračovali v užívaní Sativexu si udržiavali zlepšenie pozorované od úvodnej 4-týždňovej terapeutickej fázy, kým u pacientov, ktorých liečba sa zmenila na placebo sa znižovalo:

Modifikovaná Ashworthova škála pre spasticitu: Sativex -0,1; Placebo +1,8;  
Upravený rozdiel -1,75 (95 % IS -3,80; 0,30)

Frekvencia spazmov (za deň): Sativex -0,05; Placebo +2,41;  
Upravený rozdiel -2,53 (95 % IS -4,27; -0,79)

Narušenie spánku spasticitou (ČHS 0 až 10): Sativex -0,25; Placebo +0,59;  
Upravený rozdiel -0,88 (95 % IS -1,25; -0,51)

Chôdza na 10 metrov na čas (sekundy): Sativex -2,3; Placebo +2,0;  
Upravený rozdiel -3,34 (95 % IS -6,96; 0,26)

Index motorickej sily (rameno a noha): Nepozorovali s žiadne zmeny medzi terapeutickými skupinami.

Barthelov test aktivít každodenného života: Pomer šancí na zlepšenie: 2.04

Celkový dojem pacienta zo zmeny (OR=1,71), celkový dojem opatrotvateľa zo zmeny (OR=2,40) aj celkový dojem lekára zo zmeny (OR=1,96) zhodne preukázali štatisticky signifikantnú prevahu Sativexu nad placebom.

Dlhodobý prínos pokračujúcej liečby sa skúmal v placebom kontrolovanom skúšaní s paralelnými skupinami a randomizovaným výberom pacientov dlhodobo užívajúcich Sativex. Tridsaťšest pacientov s 3,6-ročnou priemernou dobou užívania Sativexu pred skúšaním sa randomizáciou rozdelilo do skupín, v rámci ktorých buď pokračovali v liečbe Sativexom alebo sa im na 28 dní liečba zmenila na placebo. Primárny koncový bod predstavoval čas do zlyhania liečby, definovaný ako čas od prvého dňa randomizovanej liečby do 20 % zvýšenia skóre na ČHS alebo do predčasného ukončenia randomizovanej liečby. Zlyhanie liečby zaznamenalo 44 % pacientov užívajúcich Sativex a 94 % pacientov užívajúcich placebo, pomer rizika 0,335 (95 % IS 0,16; 0,69).

V štúdiu zameranej na identifikáciu potenciálu zneužívania Sativexu sa pri dávke pozostávajúcej zo 4 naraz aplikovaných vstrekov Sativex signifikantne nelíšil od placebo. Vysoké dávky Sativexu pozostávajúce z 8 až 16 naraz aplikovaných vstrekov preukázali porovnatelný potenciál zneužívania ako ekvivalentné dávky dronabinolu, syntetického THC. V štúdiu skúmajúcej QTc bol Sativex v dávke 4 vstreky v priebehu 20 minút dvakrát denne dobre tolerovaný, ale supraterapeutická dávka 18 vstrekov v priebehu 20 minút dvakrát denne viedla k významnej psychoaktivite a zhoršeniu kognitívnych funkcií.

### Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť Sativexu bola hodnotená v 12 týždňovej radomizovanej, dvojito zaslepenej, kontrolovanej štúdie, zahŕňajúcej 72 detí a dospelých, vo veku od 8 do 18 rokov, s mozgovou obrnou alebo traumatickým poškodením centrálneho nervového systému. Po 24 týždňovej

nezaslepenej rozšírenej šúdii, nasledovala placebo kontrolovaná fáza. V tejto štúdii bola počas 9 týždňov titrovaná maximálna, povolená, denná dávka 12 vstrekov. Na začiatku bola u väčšiny pacientov závažne poškodená motorická funkcia (Gross Motor Function Classification Scale level IV or V). Primárny koncový ukazovateľom účinnosti bola zmena závažnosti spasticity od 0 do 10 bodov (ČHS) východiskovej hodnoty, čo je zhodnotenie výsledku zaznamenané opatrovateľom. Po 12 týždňoch liečby bola priemerná hodnota oproti východiskovej hodnote ČHS spasticity ošetrenej Sativexom – 1,850 (SD 1,9275) a u účastníkov placebo 1,573 (SD 2,0976). Najmenší priemerný rozdiel medzi dvoma skupinami (-0,166, 95% CI -1,119, 0,787) neboli štatisticky významné ( $p = 0,7291$ ).

V tejto štúdii sa nezaznamenali žiadne nové zistenia týkajúce sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje u detí mladších ako 8 rokov (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

## 5.2 Farmakokinetické vlastnosti

### Absorpcia

Po podaní Sativexu (štyri vstreky) sa THC aj CBD dosť rýchlo absorbuju a do 15 minút po jedinom orálnom podaní sa objavia v plazme. Pri Sativexe sa asi 45-120 minút po podaní jedinej 10,8 mg dávky THC dosiahla priemerná hodnota  $C_{max}$  okolo 4 ng/ml a táto dávka bola obvykle dobre tolerovaná, s nevýznamnými údajmi o signifikantnej psychoaktivite.

Ak sa Sativex podával s jedlom, priemerná  $C_{max}$  a AUC pre THC boli 1,6-násobne až 2,8-násobne vyššie v porovnaní s podaním nalačno. Zodpovedajúce parametre pre CBD sa zvýšili 3,3-násobne a 5,1-násobne.

Medzi pacientmi existuje vysoký stupeň variability vo farmakokinetických parametroch. Po podaní jedinej dávky Sativexu (štyri vstreky) nalačno preukázali priemerné plazmatické hladiny THC CV (koeficient variácie) 57,3 % pre  $C_{max}$  (rozmedzie 0,97-9,34 ng/ml) a CV 58,5 % pre AUC (rozmedzie 4,2-30,84 h\*ng/ml). Podobne pri CBD bol % CV pre tie isté parametre 64,1 % (rozsah 0,24-2,57 ng/ml) a 72,5 % (rozsah 2,18-14,85 ng/ml) v uvedenom poradí. Po deviatich po sebe nasledujúcich dňoch dávkowania boli hodnoty % CV 54,2 % (rozsah  $C_{max}$  = 0,92-6,37) a 37,4 % (AUC<sub>0-t</sub> = 5,34-15,01 h\*ng/ml) pre THC, a 75,7 % (rozsah  $C_{max}$  0,34-3,39 ng/ml) a 46,6% (AUC<sub>0-t</sub> = 2,40-13,19 h\*ng/ml) pre CBD v uvedenom poradí.

Po podaní jedinej a opakovanej dávok je medzi pacientmi vysoký stupeň variability farmakokinetických parametrov. Z 12 jedincov, ktorí dostali štyri vstreky Sativexu ako jedinú dávku sa po deviatich dňoch viacnásobného dávkowania u ôsmich znížila  $C_{max}$ , kým u troch došlo k jej zvýšeniu (1 vypadol). Pokial' ide o CBD, u siedmich došlo k zníženiu  $C_{max}$  po viacnásobnom dávkovaní, kým štyria zaznamenali zvýšenie.

Ked' sa Sativex podáva orálne, plazmatické hladiny THC a iných kanabinoidov sú nižšie v porovnaní s hladinami dosiahnutými po inhalácii kanabinoidov v podobnej dávke. Dávka 8 mg odpareného extraktu THC podávaná inhaláciou viedla do niekol'kých minút po podaní k priemernej plazmatickej  $C_{max}$  viac ako 100 ng/ml, spolu so signifikantnou psychoaktivitou.

### Tabuľka zobrazujúca FK parametre Sativexu, odpareného extraktu THC a fajčenej konopy

	$C_{max}$ THC ng/ml	$T_{max}$ THC minúty	AUC <sub>(0-t)</sub> THC ng/ml/min.
Sativex (poskytujúci 21,6 mg THC)	5,40	60	1362

Inhalovaný odparený extrakt THC (poskytujúci 8 mg THC)	118,6	17,0	5987,9
Fajčená konopa* (poskytujúca 33,8 mg THC)	162,2	9,0	Žiadne údaje

\*Huestis et al, Journal of Analytical Toxicology 1992; 16:276-82

### Distribúcia

Kedže kanabinoidy sú vysoko lipofilné, rýchlo sa absorbuju a distribuujú do telesného tuku. Výsledné koncentrácie v krvi po orálnom podaní Sativexu sú nižšie ako koncentrácie získané inhaláciou tej istej dávky THC, pretože absorpcia je pomalšia a redistribúcia do tukových tkanív je rýchlejšia. Časť THC dodatočne podstúpi hepatálny „first pass“ metabolizmus na 11-OH-THC, ktorý predstavuje prvý metabolit THC, ktorý potom prechádza ďalšou oxidáciou na 11-nor-9-COOH-THC, čo je najviac sa vyskytujúci metabolit THC a CBD sa podobne metabolizuje na 7-OH-CBD. Väzba THC na proteíny je vysoká (~97 %). THC a CBD môžu byť až štyri týždne uchovávané v tukových tkanivách, z ktorých sa v subterapeutických hladinách pomaly uvoľňujú naspäť do krvného obehu, potom sa metabolizujú a vylúčia močom alebo stolicou.

### Metabolizmus

THC a CBD sa metabolizujú v pečeni. Okrem toho časť THC podstúpi hepatálny „first pass“ metabolizmus na 11-OH-THC, ktorý predstavuje prvý metabolit THC, ktorý potom prechádza ďalšou oxidáciou na 11-nor-9-COOH-THC, čo je najviac sa vyskytujúci metabolit THC a CBD sa podobne metabolizuje na 7-OH-CBD. Izoenzým 2C9 ľudského hepatálneho P<sub>450</sub> katalyzuje tvorbu 11-OH-THC, primárneho metabolitu, ktorý sa ďalej metabolizuje v pečeni na ďalšie zlúčeniny vrátane 11-norkarboxy-Δ<sup>9</sup>-THC (THC-COOH), najbohatšie zastúpeného metabolitu v ľudskej plazme a moči. Podrodina P<sub>450</sub>-3A katalyzuje tvorbu ďalších hydroxylovaných vedľajších metabolítov. CBD podlieha rozsiahlemu metabolizmu a v moči sa identifikovalo viac ako 33 metabolítov. Hlavná metabolická dráha je hydroxylácia a oxidácia na C-7, po ktorej nasleduje ďalšia hydroxylácia na pentylovej a propenylovej skupine. Väčšinu identifikovaného oxidovaného metabolitu tvorí kyselina kanabidiolová obsahujúca bočný hydroxyetyllový reťazec.

Pozri časť 4.5 pre informáciu o liekových interakciách a metabolizme enzýmovým systémom cytochrómu P<sub>450</sub>.

### Prenášače

V *in vitro* štúdií Sativex v klinicky významných koncentráciách neinhiboval nasledujúce prenášače: BCRP, BSEP, OAT1, OAT3, OCT2, MATE1, MATE2-K, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, MATE1 a P-glykoproteín.

### Eliminácia

Nekompartimentálne FK analýzy z klinických štúdií so Sativexom ukazujú, že po podaní 2, 4 a 8 vstrekov je polčas terminálnej eliminácie prvého rádu z plazmy 1,94; 3,72 a 5,25 pre THC a 5,28; 6,39 a 9,36 pre CBD v uvedenom poradí.

Z literatúry je známe, že eliminácia perorálne aplikovaných kanabinoidov z plazmy je bifázická, s úvodným polčasom približne štyri hodiny a polčasmi terminálnej eliminácie trvajúcimi rádovo 24 až 36 hodín alebo dlhšie. Kanabinoidy sa distribuujú po celom tele; sú vysoko rozpustné v tukoch a hromadia sa v tukovom tkanive. Uvoľňovanie kanabinoidov z tukového tkaniva je zodpovedné za predĺžený polčas terminálnej eliminácie.

V špeciálnej PK štúdie zameranej na poruchu funkcie pečene jednorazová oromukozálna dávka štyroch vstrekov Sativexu (10,8mg THC a 10 mg CBD) neprekázala žiadny významný rozdiel v klírense THC alebo CBD u jedincov s miernym poškodením pečene a zdravých dobrovoľníkov.

V skupine pacientov so stredne ľažkým a závažnou poruchou funkcie pečene sa však podstatne znížil klírens a predĺžil polčas eliminácie.

### 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciah považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.

Štúdie reprodukčnej toxicity vykonané s extraktmi THC a CBD prítomnými v Sativexe nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na samčiu ani samičiu fertilitu v zmysle počtom páriacich sa zvierat; počet fertilených samcov a samíc, ani na ukazovatele párenia alebo fertility. Vyskytli sa zníženia absolútnych hmotností nadsemenníkov, s dávkou „bez účinku“ na samčiu fertilitu na úrovni 25 mg/kg/deň (150 mg/m<sup>2</sup>). V štúdiach na potkanoch boli úrovne dávok „bez účinku“ na prežívanie vo včasnom embryonálnom a fetálnom období približne 1 mg/kg/deň (6 mg/m<sup>2</sup>), čo je blízko alebo menej ako pravdepodobná maximálna úroveň ľudskej dávky Sativexu. Na úrovni dávok významne prevyšujúcich pravdepodobné maximálne úrovne ľudských dávok neexistuje žiadny dôkaz poukazujúci na akúkoľvek teratogénnu aktivitu u potkanov ani u králikov. Avšak v prenatálnych a postnatálnych štúdiách potkanov sa pri dávkach 2 a 4 mg/kg/deň (12, respektívne 24 mg/m<sup>2</sup>), pozorovalo zhoršenie prežívania mláďať a materinskej starostlivosti. Údaje z literatúry preukázali negatívne účinky THC a/alebo CSD na počet a pohyblivosť spermii.

V štúdiách na zvieratách sa podľa očakávania z dôvodu lipofilnej povahy kanabinoidov zistili významné hladiny kanabinoidov v materskom mlieku. Po opakovanom podávaní sa kanabinoidy koncentrovali v materskom mlieku (40 až 60 -násobok plazmatickej hladiny). Dávky prevyšujúce bežné klinické dávky môžu mať vplyv na intenzitu rastu dojčených detí.

## 6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

### 6.1 Zoznam pomocných látok

bezvodý etanol  
propylénglykol  
silica máty piepornej

### 6.2 Inkompabilita

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

### 6.3 Čas použiteľnosti

2 roky  
Stabilita pri používaní po prvom otvorení:  
10 ml injekčná liekovka: 42 dní od dátumu otvorenia.

### 6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 až 8 °C).  
Po otvorení a používaní spreju nie je uchovávanie v chladničke nevyhnutné, neuchovávajte však pri teplote vyššej ako 25 °C.  
Uchovávajte vo vzpriamenej polohe.

## **6.5 Druh obalu a obsah balenia**

Sprejová nádoba z jantárového skla typu I (10 ml nádobka je z jantárového skla pokrytého plastom) je vybavená dávkovacou pumpičkou s polypropylénovou ponornou trubicou a elastomérovým hrdlom, pokrytým polypropylénovým uzáverom. Dávkovacia pumpička vydáva 100 mikrolitrov na jeden vstrek.

Veľkosť balenia: 10 ml.

Balenie s veľkosťou 10 ml umožňuje po príprave vydať až 90 dávok (vstrekov) s objemom 100 mikrolitrov.

Sativex je k dispozícii v škatuľke obsahujúcej 3 sprejové nádoby.

## **6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu**

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami

## **7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited  
Fifth Floor  
Waterloo Exchange  
Waterloo Road  
Dublin 4  
Írsko

## **8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO**

63/0251/12-S

## **9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDLŽENIA REGISTRÁCIE**

Dátum prvej registrácie: 12. júna 2012  
Dátum posledného predĺženia registrácie: 09. novembra 2018

## **10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU**

08/2024